

## YLÄ- tai ALALUOMIPLASTIA

### TUOTTEET KOTIHOITOOON

- Sebu-Wash Gel Cleanser
- AVST 1
- Antioxidant & Peptide eye gel

### KÄYTTÖOHJE

**IHON ESIVALMISTELU:** vähintään 3 viikkoa, mielellään 3 kuukautta ennen leikkausta

#### Aamuin illoin:

- Levitä yksi pumppaus Antioxidant & Peptide Eye Gel:iä koko silmänympärysalueelle ja erityisesti sinne, mihin leikkausviilto tulee
- Levitä AVST 1 -voide silmänympärysgelin päälle ja koko kasvoille.

**IHON JÄLKIHOITO:** Kysy milloin kotihoitotuotteiden käytön voi aloittaa leikkauksen jälkeen.

#### Aamuin illoin:

- Sekoita pieni määrä Sebu-Wash:ia veden kanssa ja puhdista iho hellästi hieroen.
- Levitä yksi pumppaus Eye Gel:iä silmänympärysalueelle ja erityisesti leikkaushaavan kohdalle.
- Levitä AVST1 -voide silmänympärysgelin päälle ja koko kasvoille.

HUOM. Jos olet aspiriinille allerginen, käytä Low Foam Cleansing Gel:iä Sebu-Wash:in tilalla.

Jatkuva, pitkäaikainen Environ A-vitamiinituotteiden käyttö takaa parhaat tulokset leikkaushoidosta.